



COMPOSICIÓN PORCENTUAL:

	Porcentaje en peso
Ingrediente activo	
Diflubenzuron: 1-(4-clorofenil)-3(2,6-difluorobenzoil)urea	21.95%
(Equivalente a 240 g de I.A./L a 25°C)	
Ingredientes inertes	
Emulsificantes, espesantes y solventes	78.05%
Total	100.00%

INSTRUCCIONES DE USO:**Siempre calibre el equipo de aplicación**

CARONTE® es un regulador de crecimiento de los insectos, controla las plagas que se indica a continuación:

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS

Cultivo	Plagas	Dosis (L/ha)	Instrucciones
Chile (7)	Picudo del chile (<i>Anthonomus eugeni</i>)	0.2-0.35	Realizar dos aspersiones al follaje a intervalos de 7 días. Volumen de aplicación 450 L/ha.
Maíz (50)	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0.2-0.35	Realizar dos aspersiones al follaje y al cogollo a intervalos de 7 días. Volumen de aplicación 500 L/ha.
Limonero, naranjo, toronjo y mandarino (21)	Ácaro arador de los cítricos (<i>Phyllocoptruta oleivora</i>)	1-1.5	Realizar dos aspersiones al follaje a intervalos de 6 días. Volumen de aplicación 600 L/ha.
Brócoli (14)	Palomilla dorso de diamante (<i>Plutella xylostella</i>)	0.3-0.35	Realizar dos aspersiones al follaje a intervalos de 8 días. Volumen de aplicación 300 L/ha.
Ajo, cebolla, cebollín, espárrago (7)	Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)	0.2-0.4	Realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalos de 7 días. Volumen de aplicación 350-450 L de agua/ha.

() = **Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Tiempo de reentrada a los lugares tratados: No reingresar a las áreas tratadas, hasta que no hayan transcurrido 24 horas de aplicado el producto.

HELM DE MÉXICO, S.A.

Protón Núm. 2 Parque Industrial Naucalpan - 53489 Naucalpan, Edo. de México

Tel.: (55) 5228-9900 ext. 296 y 303 - Fax: (55) 5300-5731 - e-mail: helm@helm-mexico.com.mx