

Neemix 4.5

INSECTICIDA REGULADOR
DEL CRECIMIENTO

Uso: Insecticida

Ingrediente(s) Activo(s): Azadiractina

Concentración: 4.5 % / 47.61 g de i.a.

Formulación: Concentrado Emulsificable

Registro COFEPRIS: RSCO-INAC-0101B-301-009-005

¿Qué puede hacer por mí NEEMIX 4.5?

Neemix® 4.5 es un insecticida botánico regulador del crecimiento que tiene efecto sobre un gran número de ordenes de insectos como: Ortóptera, díptera, coleóptera, lepidóptera, thysanóptera y homóptera que son los principales ordenes que afectan los cultivos agrícolas.

Al aplicar de forma foliar Neemix® 4.5 inmediatamente comienza a actuar sobre los estados inmaduros de las diversas plagas. Lo primero que ocurre es el efecto anti-alimentario. Una vez detenido el daño a hojas y tallos, se interfiere la síntesis de la hormona de la muda (edicsona) lo que ocasiona que el insecto no pueda seguir su proceso de crecimiento. Por último se ejerce el efecto reproductivo afectando la ovipostura y reduciendo la fecundidad de los mismos.

¿Porque debo usar NEEMIX 4.5?

Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.

Cuando se tienen problemas de insectos en el cultivo y queremos controlarlos de una forma eficaz pero segura al medio ambiente, la mejor herramienta es Neemix® 4.5, ya que actúa sobre un gran número de insectos, afectando sus estados inmaduros y produciendo en ellos daños irreversibles, con lo cual se obtienen mejores cosechas.

Tabla de uso

Cultivo	Plaga	Dosis	Intervalo de seguridad	Tiempo de reentrada	Recomendaciones
Ajonjolí	<i>Trichoplusia ni</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Ajonjolí	<i>Spodoptera spp</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Ajonjolí	<i>Pseudoplusia spp.</i>	0.486 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Ajonjolí	<i>Heliothis spp</i>	0.486 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Alfalfa	<i>Colias spp.</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Alfalfa	<i>Spodoptera spp.</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Alfalfa	<i>Autographa spp.</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.

Cultivo	Plaga	Dosis	Intervalo de seguridad	Tiempo de reentrada	Recomendaciones
Algodón	<i>Trichoplusia ni</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Algodón	<i>Heliothis spp.</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Algodón	<i>Spodoptera exigua</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Algodón	<i>Agrotis spp.</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Algodón	<i>Estigmene acrea</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Algodón	<i>Alabama argillacea</i>	0.486 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Algodón	<i>Bemisia spp.</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Almácigos/Invernaderos	<i>Bemisia tabaci</i>	197 - 315 mL / 400 L de agua	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.

Cultivo	Plaga	Dosis	Intervalo de seguridad	Tiempo de reentrada	Recomendaciones
Almácigos/Invernaderos	<i>Thrips spp</i>	236 - 315 mL / 400 L de agua	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Almácigos/Invernaderos	<i>Aphis spp</i>	236 - 315 mL / 400 L de agua	Sin Límite	4 horas	Supresión de estados inmaduros. Aplicación foliar. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Almácigos/Invernaderos	<i>Liriomyza spp.</i>	197 - 315 mL / 400 L de agua	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Almácigos/Invernaderos	<i>Spodoptera exigua</i>	197 - 315 mL / 400 L de agua	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Almácigos/Invernaderos	<i>Heliothis spp</i>	197 - 315 mL / 400 L de agua	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Almácigos/Invernaderos	<i>Prodenia spp</i>	197 - 315 mL / 400 L de agua	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Almácigos/Invernaderos	<i>Agrotis spp</i>	197 - 315 mL / 400 L de agua	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Almácigos/Invernaderos	<i>Trichoplusia ni</i>	197 - 315 mL / 400 L de agua	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.

Cultivo	Plaga	Dosis	Intervalo de seguridad	Tiempo de reentrada	Recomendaciones
Apio	<i>Trichoplusia ni</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Apio	<i>Spodoptera exigua</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Arroz	<i>Spodoptera exigua</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Berenjena	<i>Helicoverpa zea</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Berenjena	<i>Trichoplusia ni</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Berenjena	<i>Spodoptera exigua</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Berenjena	<i>Liriomyza spp</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Brócoli	<i>Artogeia rapae</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.

Cultivo	Plaga	Dosis	Intervalo de seguridad	Tiempo de reentrada	Recomendaciones
Brócoli	<i>Copitarsia consueta</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Brócoli	<i>Trichoplusia ni</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Brócoli	<i>Spodoptera exigua</i>	0.244 - 0.777 Lt	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Brócoli	<i>Plutella xylostella</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Cacahuete	<i>Trichoplusia ni</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Cacahuete	<i>Spodoptera exigua</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Calabacita	<i>Trichoplusia ni</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Calabacita	<i>Helicoverpa zea</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.

Cultivo	Plaga	Dosis	Intervalo de seguridad	Tiempo de reentrada	Recomendaciones
Calabacita	<i>Estigmene acrea</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Calabacita	<i>Spodoptera exigua</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Calabacita	<i>Diaphania spp</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Calabacita	<i>Mellittia satyriniformis</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Calabacita	<i>Bemisia tabaci</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Calabacita	<i>Liriomyza spp.</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Calabaza	<i>Trichoplusia ni</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Calabaza	<i>Helicoverpa zea</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.

Cultivo	Plaga	Dosis	Intervalo de seguridad	Tiempo de reentrada	Recomendaciones
Calabaza	<i>Estigmene acrea</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Calabaza	<i>Spodoptera exigua</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Calabaza	<i>Diaphania spp</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Calabaza	<i>Mellittia satyriniformis</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Calabaza	<i>Bemisia tabaci</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Calabaza	<i>Liriomyza spp</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Cártamo	<i>Heliothis spp.</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Cártamo	<i>Mythimna unipuncta</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.

Cultivo	Plaga	Dosis	Intervalo de seguridad	Tiempo de reentrada	Recomendaciones
Cártamo	<i>Trichoplusia ni</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Caña de Azúcar	<i>Diatraea grandiosella</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Cebada	<i>Mythimna unipuncta</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Cebolla	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Cebolla	<i>Spodoptera exigua</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Chícharo	<i>Helicoverpa zea</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Chícharo	<i>Spodoptera exigua</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Chícharo	<i>Trichoplusia ni</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.

Cultivo	Plaga	Dosis	Intervalo de seguridad	Tiempo de reentrada	Recomendaciones
Chile	<i>Helicoverpa zea</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Chile	<i>Spodoptera exigua</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Chile	<i>Trichoplusia ni</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Chile	<i>Liriomyza spp</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Chile	<i>Bemisia tabaci</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar. También en el envés. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Col	<i>Artogeia rapae</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Col	<i>Copitarsia consueta</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Col	<i>Trichoplusia ni</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.

Cultivo	Plaga	Dosis	Intervalo de seguridad	Tiempo de reentrada	Recomendaciones
Col	<i>Spodoptera exigua</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Col	<i>Plutella xylostella</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Col de Bruselas	<i>Artogeia rapae</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Col de Bruselas	<i>Copitarsia consueta</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Col de Bruselas	<i>Trichoplusia ni</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Col de Bruselas	<i>Spodoptera exigua</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Col de Bruselas	<i>Plutella xylostella</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Coliflor	<i>Artogeia rapae</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.

Cultivo	Plaga	Dosis	Intervalo de seguridad	Tiempo de reentrada	Recomendaciones
Coliflor	<i>Copitarsia consueta</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Coliflor	<i>Trichoplusia ni</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Coliflor	<i>Spodoptera exigua</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Coliflor	<i>Plutella xylostella</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Espárrago	<i>Spodoptera exigua</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Fresa	<i>Trichoplusia ni</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Fresa	<i>Heliothis spp.</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Fresa	<i>Spodoptera exigua</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.

Cultivo	Plaga	Dosis	Intervalo de seguridad	Tiempo de reentrada	Recomendaciones
Fresa	<i>Liriomyza spp</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Fresa	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar. Aplicar en el envés. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Frijól	<i>Trichoplusia ni</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Frijól	<i>Spodoptera exigua</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Frijól	<i>Helicoverpa zea</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Frijól	<i>Estigmene acrea</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Frijól	<i>Anticarsia gemmatalis</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Frijól	<i>Liriomyza spp</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.

Cultivo	Plaga	Dosis	Intervalo de seguridad	Tiempo de reentrada	Recomendaciones
Frijól	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar. Aplicar en el envés. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Girasol	<i>Trichoplusia ni</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Tomate	<i>Trichoplusia ni</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Tomate	<i>Heliothis spp.</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Tomate	<i>Spodoptera exigua</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Tomate	<i>Manduca quinquemaculata</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Tomate	<i>Keiferia lycopersicella</i>	0.486 -0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Tomate	<i>Lyriomyza munda</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.

Cultivo	Plaga	Dosis	Intervalo de seguridad	Tiempo de reentrada	Recomendaciones
Tomate	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar. Aplicar en el envés. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Lechuga	<i>Trichoplusia ni</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Lechuga	<i>Artogeia rapae</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Lechuga	<i>Spodoptera exigua</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Lechuga	<i>Plutella xylostella</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Limón	<i>Papilio cresphontes</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Maíz	<i>Diatraea grandiosella</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Maíz	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.

Cultivo	Plaga	Dosis	Intervalo de seguridad	Tiempo de reentrada	Recomendaciones
Maíz	<i>Helicoverpa zea</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Maíz	<i>Mocis latipes</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Maíz	<i>Mythimna unipuncta</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Maíz	<i>Agrotis ipsilon</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Manzana	<i>Cydia pomonella</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Sandía	<i>Trichoplusia ni</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Sandía	<i>Helicoverpa zea</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Sandía	<i>Estigmene acrea</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.

Cultivo	Plaga	Dosis	Intervalo de seguridad	Tiempo de reentrada	Recomendaciones
Sandía	<i>Spodoptera exigua</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Sandía	<i>Diaphania spp</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Sandía	<i>Mellittia satyriniformis</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Sandía	<i>Bemisia tabaci</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Sandía	<i>Liriomyza spp</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Naranja	<i>Papilio cresphontes</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Nuez	<i>Hyphantria cunea</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Okra	<i>Helicoverpa zea</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.

Cultivo	Plaga	Dosis	Intervalo de seguridad	Tiempo de reentrada	Recomendaciones
Ornamentales	<i>Trichoplusia ni</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Ornamentales	<i>Spodoptera spp</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Ornamentales	<i>Liriomyza spp</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Ornamentales	<i>Aphis spp</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Ornamentales	<i>Bemisia tabaci</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar. Aplicar en el envés. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Papa	<i>Trichoplusia ni</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Papa	<i>Spodoptera exigua</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Papa	<i>Phthorimaea operculella</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.

Cultivo	Plaga	Dosis	Intervalo de seguridad	Tiempo de reentrada	Recomendaciones
Papa	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar. Aplicar en el envés. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Pepino	<i>Trichoplusia ni</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Pepino	<i>Helicoverpa zea</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Pepino	<i>Estigmene acrea</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Pepino	<i>Spodoptera exigua</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Pepino	<i>Diaphania spp.</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Pepino	<i>Mellittia satyriniformis</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Pepino	<i>Bemisia tabaci</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.

Cultivo	Plaga	Dosis	Intervalo de seguridad	Tiempo de reentrada	Recomendaciones
Pepino	<i>Liriomyza spp</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Pera	<i>Cydia pomonella</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Piña	<i>Thecla basilides</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Remolacha	<i>Trichoplusia ni</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Remolacha	<i>Liriomyza spp</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Sorgo	<i>Diatraea grandiosella</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Sorgo	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Sorgo	<i>Helicoverpa zea</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.

Cultivo	Plaga	Dosis	Intervalo de seguridad	Tiempo de reentrada	Recomendaciones
Sorgo	<i>Mythimna unipuncta</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Sorgo	<i>Agrotis ipsillon</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Soya	<i>Trichoplusia ni</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Soya	<i>Pseudoplusia includens</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Soya	<i>Helicoverpa zea</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Soya	<i>Estigmene acrea</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Soya	<i>Anticarsia gemmatalis</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Soya	<i>Spodoptera exigua</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.

Cultivo	Plaga	Dosis	Intervalo de seguridad	Tiempo de reentrada	Recomendaciones
Soya	<i>Agrotis spp.</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Soya	<i>Prodenia spp.</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Tabaco	<i>Trichoplusia ni</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Tabaco	<i>Heliothis virescens</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Tabaco	<i>Manduca sexta</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Tabaco	<i>Estigmene acrea</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Tabaco	<i>Spodoptera exigua</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Tabaco	<i>Agrotis ipsilon</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.

Cultivo	Plaga	Dosis	Intervalo de seguridad	Tiempo de reentrada	Recomendaciones
Tabaco	<i>Feltia subterranea</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Tabaco	<i>Bemisia tabaci</i>	0.486 -1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar. Aplicar en el envés. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Toronjo	<i>Papilio cresphontes</i>	0.486 - 1.020 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Trigo	<i>Mythimna unipuncta</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Uva	<i>Harrisina brillians</i>	0.244 - 0.486 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Árboles (oyamel y ahuejote)	<i>Evita hyalinaria</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.
Árboles (oyamel y ahuejote)	<i>Malacosoma spp.</i>	0.244 - 0.777 L/ha	Sin Límite	4 horas	Aplicación foliar para controlar larvas. Neemix® 4.5 es un insecticida inhibidor del crecimiento e inhibidor de la alimentación de los insectos que actúa por contacto e ingestión.

Recomendaciones de uso

Úsese exclusivamente en los cultivos y plagas aquí recomendados

¡Siempre calibre su equipo de aplicación!

Métodos para preparar y aplicar el producto

Neemix® 4.5 es formulado como Concentrado emulsionable y se mezcla fácilmente al ser vaciado sobre el agua del tanque. Se recomiendan las siguientes indicaciones para la mezcla: 1) Lavar bien el equipo de aspersión. 2) Llenar con agua el tanque de mezcla hasta cubrir la mitad de la capacidad del tanque. 3) Añadir la cantidad adecuada de Neemix® 4.5 al tanque. 4) Completar con agua el llenado del tanque y agitar bien la mezcla antes de la aplicación. 5) Usar un corrector de pH cuando la mezcla exceda un pH de 6.0 (el pH ideal oscila entre 4.0 y 6.0) Aplique a la planta usando equipo de aplicación terrestre o aéreo de manera que se obtenga una cobertura completa y uniforme. Evite realizar una aplicación excesiva al punto de goteo. Las soluciones diluidas de Neemix® 4.5 deben mantenerse con un pH entre 4.0 y 6.0, y deberán ser aplicadas inmediatamente después de preparada la solución. No almacene la solución ya preparada para uso posterior. Para obtener mejores resultados use un adherente o dispersante a la dosis recomendada por el fabricante.

Neemix® 4.5 controla las larvas de los insectos cuando éstos se alimentan o quedan en contacto con el producto, ya que interfiere con su capacidad de mudar. El producto es efectivo para controlar todos los estadios larvarios. Las aplicaciones deberán efectuarse cuando las plagas aparezcan por primera vez y están en sus estadios larvarios iniciales. Repita las aplicaciones cada 7 días con la frecuencia que sea necesaria. Cuando la presión de la plaga sea alta use la dosis recomendada más alta. Cuando use las dosis bajas, combine Neemix® 4.5 con un coadyuvante tal como un aceite no fitotóxico hasta una dosis de 1% (v/v). Asegure siempre una buena cobertura ajustando el volumen de agua. Para lograr los mejores resultados inicie las aplicaciones tan pronto como inicien las primeras plagas. **APLICACIÓN TERRESTRE Volumen alto:** cuando el follaje de la planta es denso use la dosis más alta e incremente el volumen de la solución para obtener una cobertura uniforme y completa. **Volumen bajo:** Aplique el producto a una dosis de 0.244-1.02 L/Ha. Utilizando un vehículo apropiado para el equipo de aplicación. Para obtener los mejores resultados asegure una cobertura uniforme y completa. **APLICACIÓN AEREA** El producto puede ser aplicado por vía aérea a dosis de 0.244-1.02L/Ha usando equipo apropiado tal como aeronaves de ala fija o helicóptero. Seleccione un vehículo y equipo apropiado para asegurar una cobertura uniforme y completa.

Contraindicaciones

No mezclar con productos que tengan reacción muy alcalina.

Fitotoxicidad

No muestra ningún efecto fitotóxico cuando se usa bajo las recomendaciones de esta etiqueta.

Incompatibilidad

La mezcla de Neemix® 4.5 deberá hacerse con productos registrados para los cultivos antes mencionados, no debe mezclarse con productos altamente alcalinos. Para mezclas con otros productos se aconseja al usuario hacer una prueba de compatibilidad y observar

la reacción en las plantas durante los primeros días después de la aplicación.

Manejo de Resistencia

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

Garantía

Certis Agro México, S. de R.L. de C.V. garantiza la composición del producto de conformidad con lo especificado en la presente etiqueta. En caso de que dicha composición variase notablemente por causas imputables a Certis Agro México, S. de R.L. de C.V., ésta reembolsara el importe pagado por el producto. Por ningún motivo Certis Agro México, S. de R.L. de C.V. asume responsabilidad por el mal uso y manejo del producto ni por los daños.

Titular del registro

DISTRIBUIDOR: SUMMIT AGRO MEXICO, S.A. DE C.V. Rubén Darío No. 281 - 1902 Col. Bosques de Chapultepec C.P. 11580 México, D.F. Tel. (55) 5279-4340
www.summitagromexico.com.mx TITULAR DEL REGISTRO CERTIS AGRO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. Bosque de ciruelos 180 PP 101 Col. Bosques de las Lomas. 11700, Miguel Hidalgo, México D.F. Tel. 55-55965707

