



VELSIDOL 25 CE

Insecticida y/o acaricida agrícola

Concentrado emulsionable

Producto registrado

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:

Porcentaje en peso

Ingrediente activo:

Diazinón: 0,0-dietil 0-(6-metil-
2-(1-metil etil)-4-pirimidinil) fosforotioato

No menos de:25.00%

(Equivalente a 232 g de I.A./L)

Ingredientes inertes:

Solventes, emulsificantes y compuestos relacionados

No más de:75.00%

Total:100.00%

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Lea cuidadosamente las instrucciones.

Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, mascarilla contra el polvo y vapores tóxicos, goggles o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno).

No coma, beba o fume durante la preparación y aplicación del producto.

No aplique contra el viento.

Después de un día de trabajo, descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación (en el mismo campo tratado), lavándolos con detergente y una solución alcalina como lejía, báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.



Advertencia sobre riesgos:

VELSIDOL 25 CE, es un producto ligeramente tóxico, por lo que deberá evitar su ingestión, inhalación y contacto con la piel y ojos.

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes, manténgase fuera del alcance de los niños y de animales domésticos, no almacenar en casas habitación, no deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactación y personas menores de 18 años, no se reutilice el envase, destrúyase.

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

LIGERAMENTE TOXICO

INSTRUCCIONES DE USO:

Siempre calibre el equipo de aplicación

VELSIDOL 25 CE, es un insecticida formulado como concentrado emulsionable y se aplica diluido en agua en forma de aspersion directamente al follaje en los cultivos que aquí se indican. VELSIDOL 25 CE es un insecticida organofosforado recomendado para el combate y control de las plagas descritas en el cuadro.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: VELSIDOL 25 CE, está formulado como concentrado emulsionable por lo que para aplicarse, debe disolverse la dosis recomendada del producto en la cantidad de agua necesaria para lograr un cubrimiento total y uniforme en el follaje de las plantas tratadas.

CONTRAINDICACIONES: No se aplique en horas de calor intenso. No aplicar cuando la velocidad del viento sea fuerte, (más de 15 km/h) o si existe alta probabilidad de lluvia. Evite la entrada a campos recién tratados.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar con acefate, metamidofos, triclorfon, anilazina, maneb, zineb y productos de fuerte reacción alcalina.



FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta. Cuando se desconozca la compatibilidad de alguna mezcla, deberá hacerse una prueba previa a su aplicación para evitar efectos fitotóxicos.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS: Retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto. Recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa y manténgala abrigada y en reposo.

Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, lave la parte afectada con agua limpia corriente durante 15 minutos. Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito introduciendo un dedo en la garganta, o administrando agua salada tibia (una cucharada de sal disuelta en un vaso con agua tibia). Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

Grupo químico: Organofosforados.

Síntomas de intoxicación:

Leves: Dolor de cabeza, visión borrosa, náuseas, vómito, diarrea y opresión torácica.

Agudos: Contracción de la pupila, salivación, lagrimeo, descarga acuosa nasal, debilidad severa, micción y defecación involuntaria, calambres y sensación de asfixia.

Tratamiento y antídoto: En caso de adultos, suministrar 2 comprimidos de 0.5 mg cada uno de atropina, repitiendo la dosis si es necesario. La terapia en niños debe supervisarla un médico.



Cuando los síntomas sean severos, administrar de 2 a 4 mg de sulfato de atropina por vía intravenosa lentamente, hasta completa atropinización.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE: No contamine con este producto corrientes, depósitos o fuentes de agua. En caso de derrames, absorber el producto derramado con inertes en polvo, aserrín, ceniza u otro material absorbente. Dejar el tiempo suficiente para asegurar la total absorción. Este producto es tóxico a peces y abejas. Con la finalidad de disminuir el impacto de los envases vacíos al ambiente, éstos serán confinados y enviados a centros de confinamiento para su destrucción. Destruya los envases vacíos. Después del triple lavado, disponga de los envases vacíos como lo establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene y transporte este producto en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave, alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado.

GARANTÍA: Velsimex, S.A. de C.V., garantiza el contenido del envase conforme a la composición porcentual de la etiqueta, pero como su uso y manejo están fuera de nuestro control, el fabricante y distribuidor no se hacen responsables de los resultados que con este producto se obtengan.

USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUI RECOMENDADOS

Cultivos	Plagas		Dosis (L/ha)	Intervalo de seguridad
	Nombre común	Nombre científico		
Alfalfa	Chicharrita Pulgón manchado Pulgón verde Trips	<i>Aceratogallia curvata</i> <i>Therioaphis maculata</i> <i>Acyrtosiphon pisum</i> <i>Frankliniella spp</i>	1.0 1.0-1.5	(5L)
Cacahuete	Chicharrita Doradilla Trips	<i>Empoasca spp</i> <i>Diabrotica sp</i> <i>Frankliniella spp</i>	1.5-2.0 1.0-1.5 1.5-2.0	(28)
Melón, sandía y pepino	Minador de la hoja Mosquita blanca Pulga saltona Pulgón del melón	<i>Liriomyza sp</i> <i>Trialeurodes spp</i> <i>Epidrix spp</i> <i>Aphis gossypii</i>	1.- 1.5 1.0-1.5 1.0-1.5 1.0-1.5	(3) (3) (7) (7)
Apio	Araña roja Chinche lygus Pulgón	<i>Tetranychus spp</i> <i>Lygus sp</i> <i>Aphis spp</i>	1.0	(10)
Caña de azúcar	Pulgón amarillo Mosca pinta Barrenador del tallo	<i>Sipha flava</i> <i>Aeneolamia postica</i> <i>Chilo loftini</i>	0.5 1.0-1.5	(28)
Algodonero	Pulgón del algodón y del melón Trips Chinche manchadora Conchuela Chicharrita Mosquita blanca	<i>Aphis gossypii</i> <i>Frankliniella spp</i> <i>Dysdercus spp</i> <i>Chlorochroa ligata</i> <i>Euttetix tenellus</i> <i>Bemisia tabaci</i>	1.0-1.5 1.5-2.0	(14)
Cebolla	Chinche lygus Gusano de la cebolla Minador de la hoja Trips	<i>Lygus lineolaris</i> <i>Hylemya antigua</i> <i>Liriomyza sp</i> <i>Aeolothrips major</i>	1.0-1.5 1.0 1.0-1.5	(10)
Chicharo	Araña roja Chicharrita Minador de la hoja Pulgón verde Trips	<i>Tetranychus sp</i> <i>Empoasca sp</i> <i>Liriomyza pusilla</i> <i>Acyrtosiphon pisum</i> <i>Frankliniella sp</i>	1.0-1.5	(21)
Chile	Minador de la hoja Mosquita blanca Pulga saltona Pulgón	<i>Liriomyza sp</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Chaetocnema spp</i> <i>Aphis spp</i>	1.0-1.5	(5)
Fresa	Araña ciclamina Mosquita blanca Pulgón Trips	<i>Steneotarsonemus pallidus</i> <i>Trialeurodes packardi</i> <i>Pentatrichopus fragaefolli</i> <i>Thrips spp</i>	4.0-5.0 3.0-4.0 2.0-4.0 2.0-3.0	(5)
Frijol	Chicharrita Diabrotica Mosquita blanca Mosquita del frijol Minador de la hoja Picudo del ejote Trips	<i>Empoasca sp</i> <i>Diabrotica balteata</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Hylemya cilicrura</i> <i>Liriomyza sp</i> <i>Apion godmani</i> <i>Caliothrips phaseoli</i> <i>Hercotrips phaseoli</i>	1.0-1.25 1.0 1.0-1.5 1.0	(7)

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

(SL): Sin límite.

VELSIMEX, S.A. DE C.V.
CALIDAD QUE PREVALECE



VELSIMEX, S.A. DE C.V.

Av. Central Núm. 206 3er. piso - Col. San Pedro de los Pinos - 01180 México, D.F.

Tel.: 5278-4640 - Fax: 5278-4678