

Zymbiosis

HOJA TÉCNICA



1. GENERALIDADES

Zymbiosis es un fungicida con dos ingredientes activos (manejo anti resistencia), de aplicación foliar para la prevención y control de las plagas en los cultivos detallados.

2. COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO	% EN PESO
Tebuconazol:	22.94
Carbendazim:	11.47
Ingredientes Inertes	65.59
Anticongelante, humectante/dispersante, preservante, antiespumante, espesante y medio dispersante	
TOTAL:	100.00

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS

Nombre común (ingrediente activo) Tebuconazole Carbendazim	Categoría toxicológica III Ligeramente Tóxico (color azul)
Grupo químico Tebuconazole: Triazoles Carbendazim: Benzimidazoles	Fitotoxicidad No es fitotóxico en las dosis y en los cultivos recomendados en la etiqueta
Nombre químico Tebuconazol: (RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)penta-3-ol Carbendazim: methylbenzimidazol-2-ylcarbamato	Efectos adversos Ninguno conocido
Formulación Suspensión Concentrada	Compatibilidad Si se desea hacer una mezcla de tanque, deberá realizar una prueba previa a fin de determinar compatibilidad y asegurarse de que no haya efectos fitotóxicos. La mezcla únicamente deberá realizarse con productos que estén registrados ante la Autoridad Competente y autorizados en el cultivo y enfermedad aquí indicados.



4.a RECOMENDACIONES PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Adicione agua al tanque mezclando hasta la mitad de la cantidad de agua que se desea aplicar. Agregue la cantidad de Zymbiosis a utilizar. Adicione la cantidad de agua restante manteniendo la mezcla en constante agitación.

Use el equipo de protección adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo de algodón, mascarilla para polvos o vapores, lentes industriales, guantes y botas de hule. Evite inhalar el producto durante la preparación o aplicación de la mezcla. Llene los recipientes de los equipos de aplicación siempre a favor del viento, evitando derrames. Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con detergente o una solución alcalina.

4.b RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
TRIGO (35)	ROYA <i>Puccinia striiformis</i> <i>f.s.p. tritici</i>	0.5	Hacer una aplicación al follaje a la dosis recomendada cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad. Repetir la aplicación en caso de reinfección. Gasto de agua: 450 L/ha.

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

En caso de requerir servicio de información toxicológica puede llamar a (SINTOX) de PROCCYT a los siguientes teléfonos las 24 horas del día:

En área metropolitana de la Ciudad de México: (55) 5598 66 59 y 56 11 26 34
Desde el interior de la República: 01 800 00 928 00

Mayor información:
Valent de México SA de CV
Av. Vallarta 6503 G8 Col. Cd. Granja
Zapopan, Jal. 45010
Tel. (33) 310 10 01 62
www.valent.com.mx