

Metalaxil



Familia: Fungicida

Uso: Agrícola

Formulación: Concentrado Emulsionable

Registro: RSCO-FUNG-0324-328-009-025

Fungicida sistémico, diseñado para ser aplicado a las semillas. El Metalaxil, es un ingrediente activo perteneciente a la clase química de las fenilaminas. Siendo aplicado a la semilla, es absorbido por la plántula y transportado por la corriente ascendente de la savia. De esta manera protege a las plantas jóvenes desde el interior, otorgando un período de protección de aproximadamente 2 a 8 semanas, dependiendo de las condiciones climáticas.

Características agronómicas:

PACXYL 240 CE penetra en las células del hongo e interfiere selectivamente en la síntesis del ADN, inhibiendo el crecimiento del micelio y la formación de esporas y haustorios. Puede utilizarse solo o en mezcla con fungicidas de distintos modos de acción, aumentando así el ámbito de cultivos y el espectro de acción fúngica.

Composición Porcentual:

| INGREDIENTES ACTIVOS | % EN PESO |
|---|-------------------------------|
| METALAXIL: Metil N-(metoxiacetil)-N-(2,6-xilil)-DL-alaninato. (Equivalente a 242 g de i.a./L a 20°C)..... | NO MENOS DE: 25.10% |
| INGREDIENTES INERTES Disolvente y emulsificantes..... | NO MÁS DE: 74.90% |
| TOTAL: 100% | |

Usos:

Efectivo en el control de enfermedades inducidas por Oomycetes en cultivos como: aguacate, berenjena, chile, cucurbitáceas, cítricos, jitomate, lechuga, ornamentales, papa y tomate de cáscara.
 Aplique **PACXYL 240 CE** contra las enfermedades y en las dosis recomendadas.
 No es fitotóxico en las dosis y en los cultivos aquí recomendados.

"Antes de usar este producto, por favor lea la información de la etiqueta".

| CULTIVOS | ENFERMEDAD | DOSIS (L/ha) | OBSERVACIONES | APLICACIÓN |
|---|--|---------------------------------|---|------------|
| Chile, Berenjena, Jitomate, Tomate verde, Papa, Pimiento morrón, Okra (7) | Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>) | 0.5 - 1.25 | Realizar 2 aplicaciones a intervalos de 7 días, en el follaje en un volumen de 450 L de agua/ha. | Foliar |
| Piña (15) | Pudrición del corazón (<i>Phytophthora parasitica</i>) | 0.5 - 1.25 | Realizar 2 aplicaciones a intervalos de 7 días, en el follaje en un volumen de 450 L de agua/ha. | En drench |
| Aguacate (28) | Tristeza del Aguacate (<i>Phytophthora cinnamomi</i>) | 2 - 4 | Realizar 3 aplicaciones al suelo, al contorno del árbol a intervalo de 15 días; cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación 500 - 600 L de agua/ha. | |
| Limón, Naranja, Toronja, Lima, Tangerino, Pomelo, Cidro (21) | Gomosis de los cítricos (<i>Phytophthora parasitica</i>) | 50 - 100 mL/100L de agua | Realizar 3 aplicaciones a intervalos de 15 días, al suelo (contorno del árbol), cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad, en un volumen de aplicación de 400 - 600 L de agua/ha. | |
| Chile, Berenjena (7) | Damping-off o ahogamiento (<i>Phytophthora capsici</i>) | 10 - 15 5.0 | <p>Aplice PACKYL al momento de la siembra en suficiente cantidad de agua (200 a 500 litros), para obtener una cobertura uniforme. Si no se espera lluvia antes de que las plantas continúen su desarrollo, el PACKYL debe ser incorporado mecánicamente antes de la siembra o ser translocado a la zona radicular después del trasplante con un riego de 5 a 15 cm³.</p> <p>Después de la primera aplicación, deben realizarse de 1 a 2 aplicaciones adicionales, dirigidas a la base de la planta, la dosis será de 5.0 L/ha, a intervalos de 30 días. La aplicación debe cubrir los 15 a 20 cm de suelo en ambos lados de la planta.</p> | |

() Intervalo de Seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
 Tiempo de reentrada a zonas tratadas: 12 Horas después de la aplicación.

Formas de aplicación:

Antes de usar el producto agite el envase. Abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de garantía y antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una premezcla en un recipiente limpio por separado, agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore lentamente la cantidad de **PACXYL 240 CE** a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una solución uniforme. Sin dejar de agitar vierta la premezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua (libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a fin de homogenizar la mezcla y aplicar de inmediato. La aplicación de este producto se realiza en forma de aspersion dirigida a la base del cuello de la planta, posteriormente debe realizarse un riego para promover que el producto sea incorporado a la zona radicular.

No aplicar **PACXYL 240 CE** más de 4 veces por temporada y alternar con fungicidas de contacto. No aplique **PACXYL 240 CE** en hora de calor intenso, ni cuando la velocidad del viento sea alta.

Almacenamiento y seguridad:

El producto debe mantenerse en su empaque original, bajo techo, ventilado y seco; y alejado del calor y fuego directo.

Evite contacto con ojos y piel, utilice equipo de protección personal para su manejo y aplicación, como: lentes, mascarilla, guantes y botas de hule.

Fecha de revisión: 03/05/2021



Importante:

La información contenida en este documento es correcta según nuestros conocimientos actuales. Insecticidas del Pacífico S.A. de C.V. no incurre en responsabilidad alguna con respecto a la exactitud o integridad de dicha información, a menos que señale explícitamente como garantizada. No se acepta responsabilidad explícita o implícita por la seguridad, aptitud del producto para un propósito en particular o los resultados obtenidos de su uso. El comprador y usuario asume los riesgos y responsabilidades por todos y cada uno de los perjuicios (incluso muerte), pérdidas o daños a personas y propiedades, derivados del uso de este producto. Bajo ninguna circunstancia se aceptará responsabilidad por daños especiales, incidentales o consecuenciales.